

2026 - 2027 Texas Minimum State Vaccine Requirements for Students Grades K - 12

This chart summarizes the vaccine requirements incorporated in the Texas Administrative Code (TAC), Title 25 Health Services, §§97.61-97.72. This document is not intended as a substitute for the TAC, which has other provisions and details. The Department of State Health Services (DSHS) is granted authority to set immunization requirements by the Texas Education Code, Chapter 38.

IMMUNIZATION REQUIREMENTS

A student shall show acceptable evidence of vaccination prior to entry, attendance, or transfer to a public or private elementary or secondary school in Texas.

Vaccine Required (Attention to notes and footnotes)	Minimum Number of Doses Required by Grade Level												Notes			
	Grades K - sixth						Grade seventh		Grades eighth - 12th							
	K	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	
Diphtheria/Tetanus/Pertussis (DTaP/DTP/DT) Tetanus/Diphtheria/ Acellular Pertussis (Td/Tdap)	Five doses or four doses						Three dose primary series and one booster dose of Tdap/Td within the last five years		Three dose primary series and one booster dose of Tdap/Td within the last 10 years		For K – sixth grade: five doses of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine; one dose must have been received on or after the fourth birthday. However, four doses meet the requirement if the fourth dose was received on or after the fourth birthday. ¹ For students age 7 years and older, three doses meet the requirement if one dose was received on or after the fourth birthday. ¹ For seventh grade: one dose of Tdap is required if at least five years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine.* For eighth – 12th grade: one dose of Tdap is required when 10 years have passed since the last dose of tetanus-containing vaccine. **Td is acceptable in place of Tdap if a medical contraindication to pertussis exists.					
Polio	Four doses or three doses												For K – 12th grade: four doses of polio; one dose must be received on or after the fourth birthday. ¹ However, three doses meet the requirement if the third dose was received on or after the fourth birthday. ¹ Polio vaccine is not required for persons 18 years of age or older.			
Measles, Mumps, and Rubella ² (MMR)	Two doses												For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹ Students vaccinated prior to 2009 with two doses of measles and one dose each of rubella and mumps satisfy this requirement.			
Hepatitis B ²	Three doses												For students age 11 – 15 years old: two doses meet the requirement if adult hepatitis B vaccine (Recombivax®) was received. Dosage (10 mcg /1.0 mL) and type of vaccine (Recombivax®) must be clearly documented. If Recombivax® was not the vaccine received, a three-dose series is required.			
Varicella ^{2, 3}	Two doses												For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹			
Meningococcal (MCV4)							One dose						For seventh – 12th grade: one dose of quadrivalent meningococcal conjugate vaccine is required on or after the student's 11th birthday. ¹			
Hepatitis A ²	Two doses												For K – 12th grade: two doses are required, with the first dose received on or after the first birthday. ¹			

NOTE: Shaded area indicates that the vaccine is not required for the respective grade.

↓ Notes on the back page, please turn over. ↓

Requisitos mínimos de vacunación en Texas de 2026 a 2027 para estudiantes de *kínder* a 12.º grado

Esta gráfica resume los requisitos de vacunación incorporados a las secciones 97.61 a 97.72, título 25, Servicios de salud, del Código Administrativo de Texas (TAC). Este documento no tiene como propósito sustituir al TAC, el cual contempla otras disposiciones y detalles. El Código Educativo de Texas, capítulo 38, Salud y seguridad, subcapítulo A, Disposiciones generales, concede al Departamento Estatal de Servicios de Salud (DSHS) la autoridad de establecer requisitos de vacunación.

REQUISITOS DE VACUNACIÓN

Los estudiantes deberán mostrar comprobantes de vacunación aceptables antes de inscribirse, asistir o ser transferidos a una guardería o escuela primaria o secundaria pública o privada de Texas.

Vacuna requerida (lea todas las notas)	Cantidad mínima de dosis requeridas por grado												Notas
	Kinder - 6.º grado						7.º grado	8.º - 12.º grado					
	K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Difteria, tétanos, tos ferina (DTaP, DTP, DT) Tétanos, difteria, tos ferina (Td, Tdap)	Cinco o cuatro dosis						Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de Tdap o Td dentro de los últimos cinco años	Una serie primaria de tres dosis y un refuerzo de Tdap o Td dentro de los últimos diez años					Kinder - 6.º grado: cinco dosis de la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; se debe aplicar una de las dosis alrededor o después del cuarto cumpleaños. Sin embargo, se cumple el requisito con cuatro dosis si la cuarta se aplica alrededor o después del cuarto cumpleaños. ¹ Los estudiantes de 7 años en adelante cumplen el requisito al aplicarse tres dosis si una de ellas se aplicó alrededor o después del cuarto cumpleaños. ¹ 7.º grado: una dosis de la vacuna Tdap si han pasado al menos cinco años desde la última dosis de una vacuna antitétanos*. 8.º - 12.º grado: una dosis de la vacuna Tdap si han pasado 10 años desde la última dosis de una vacuna antitétanos. **La vacuna Td es aceptable en lugar de la vacuna Tdap si existe una contraindicación médica para la vacuna contra la tos ferina.
Poliomielitis	Cuatro o tres dosis												Kínder a 12.º grado: cuatro dosis de la vacuna contra la polio; se debe aplicar una de las dosis alrededor o después del cuarto cumpleaños. ¹ Sin embargo, se cumple el requisito con tres dosis si la tercera se aplica alrededor o después del cuarto cumpleaños. ¹ No se requiere la vacuna contra la polio a las personas mayores de 18 años.
Sarampión, paperas y rubeola ² (MMR)	Dos dosis												Kínder a 12.º grado: dos dosis, se debe aplicar la primera alrededor o después del primer cumpleaños. ¹ Los estudiantes que fueron vacunados antes de 2009 con dos dosis contra el sarampión, una dosis contra la rubeola y una contra las paperas cumplen con este requisito.
Hepatitis B ²	Tres dosis												Estudiantes de 11 a 15 años: dos dosis si se aplican la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®). Tanto la dosis (10 mcg/1.0 ml) como el tipo de vacuna (Recombivax®) deben documentarse claramente. Si la vacuna recibida no fue Recombivax®, se requiere una serie de tres dosis.
Varicela ^{2, 3}	Dos dosis												Kínder - 12.º grado: dos dosis, se debe aplicar la primera alrededor o después del primer cumpleaños. ¹
Antimeningocócica (MCV4)							Una dosis						7.º - 12.º grado: una dosis de la vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente alrededor o después del onceavo cumpleaños. ¹
Hepatitis A ²	Dos dosis												Kínder - 12.º grado: dos dosis, se debe aplicar la primera alrededor o después del primer cumpleaños. ¹

NOTA: Las casillas sombreadas indican que no se requiere la vacuna para el grupo de edad correspondiente.

↓ Notas al reverso, dé vuelta a la página. ↓