Rev. 03/2026

NC IMMUNIZATION REQUIREMENTS
2026-2027

Pre-kindergarten	Grades K-6	Grades 7-11	Grade 12
(4) DTP/DTaP	***(5) DTP/DTaP** With booster on/after 4th birthday	***(5) DTP/DTaP** With booster on/after 4th birthday	***(5) DTP/DTaP** With booster on/after 4th birthday
		(1) Tdap Required if an individual had not previously received it and is entering the 7th grade or by 12 years of age, whichever comes first. Effective 7-1-2015	**(1) Tdap** Required for individuals who entered 7th or reached 12 years of age on or after 7-1-2015
(3) Polio	****(4) Polio** 4th dose is required on/after 4th birthday and before entering school for the first time. Effective 7-1-2015	****(4) Polio** 4th dose is required on/after 4th birthday and before entering school for the first time. Effective 7-1-2015	** **(4) Polio**
*****(1) MMR** On/after 1st birthday	*****(2) MMR** (1st dose on/after 1st birthday) at least 28 day interval needed between doses	*****(2) MMR** (1st dose on/after 1st birthday) at least 28 day interval needed between doses	*****(2) MMR** (1st dose on/after 1st birthday) at least 28 day interval needed between doses
(3) Hepatitis-B 3rd dose shall NOT be given prior to 24 weeks of age.	**(3) Hepatitis-B** 3rd dose shall NOT be given prior to 24 weeks of age.	**(3) Hepatitis-B** 3rd dose shall NOT be given prior to 24 weeks of age.	**(3) Hepatitis-B** 3rd dose shall NOT be given prior to 24 weeks of age.
(1) Varicella On/after 1st birthday	**(2) Varicella** (1st dose on/after 1st birthday) at least 28 day interval needed between doses. (As of 7-1-2015, historical documentation of disease must include approximate date or age of infection and a health care provider signature)	**(2) Varicella** (1st dose on/after 1st birthday) at least 28 day interval needed between doses. (As of 7-1-2015, historical documentation of disease must include approximate date or age of infection and a health care provider signature)	**(1) Varicella** (1st dose on/after 1st birthday) Required if no varicella disease documentation. Parent or health care provider may provide written history of disease but must include approximate date or age of infection.
(1-4) Hib Hib vaccine is not given after 5 years of age. If the 1st dose is given on/after 15 months of age, series is complete. If 4th dose is given on/after 12 months of age, series is complete. (Dosage requirement may vary depending on the vaccine type and the age when 1st dose was received.)	**Hib** Hib vaccine is not required after 5 years of age. If not yet 5 years of age, same requirements as for Pre-K.		
(1-4) Pneumococcal Conjugate Pneumococcal vaccine is not given after 5 years of age. If the 1st dose is given on/after 24 months of age, series is complete. (Dosage and interval requirements may vary depending on the age when 1st dose was received.)	**Pneumococcal Conjugate** Pneumococcal Conjugate vaccine is not required after 5 years of age. If not yet 5 years of age, same requirements as for Pre-K.	**(1) Meningococcal Conjugate** Required for individuals entering the 7th grade or by 12 years of age, whichever comes first. Effective 7-1-2015	**(2) Meningococcal Conjugate** Required for individuals entering the 12th grade or by 17 years of age, whichever comes first. (2nd dose not required if 1st dose is received on or after 16th birthday.)

Note: Four day rule applies to all required minimum ages.

* Children receiving #4 DTP/DTaP on or after 4th birthday are not required to have #5.

** Children receiving #3 Polio on or after 4th birthday and at least 6 months after 2nd dose are not required to have #4. Children aged 18 or older are not required to receive the polio vaccine.

**** If given separately: Two measles doses, two mumps doses, and one rubella dose required. The first dose must be on or after the 1st birthday, and at least a 28-day interval is required between the first and second doses. The second mumps dose is only required if you entered school on or after 7-1-2008.

REQUISITOS DE VACUNACIÓN DE CAROLINA DEL NORTE 2026-2027

Preescolar	Grados K-6	Grados 7-11	Grado 12
(4) DTP/DTaP	***(5) DTP/DTaP** con refuerzo a partir de los 4 años	***(5) DTP/DTaP** con refuerzo a partir de los 4 años	***(5) DTP/DTaP** con refuerzo a partir de los 4 años
		(1) Tdap Obligatoria si la persona no la ha recibido anteriormente y va a entrar en 7° grado o a los 12 años de edad, lo que ocurra primero. En vigor a partir del 7-1-2015	**(1) Tdap** Obligatoria para las personas que hayan entrado en 7mo grado o hayan cumplido **12** años a partir del 7-1-2015
(3) Polio	****(4) Polio** La 4ta dosis es necesaria después de que el niño cumpla 4 años y antes de entrar en la escuela por primera vez. En vigor a partir del 7-1-2015	****(4) Polio** La 4ta dosis es necesaria después de que el niño cumpla 4 años y antes de entrar en la escuela por primera vez. En vigor a partir del 7-1-2015	** **(4) Polio**
*****(1) MMR** Después de cumplir 1 año	*****(2) MMR** (1ra dosis después de cumplir 1 año) es necesario un intervalo de al menos 28 días entre las dosis	*****(2) MMR** (1ra dosis después de cumplir 1 año) es necesario un intervalo de al menos 28 días entre las dosis	*****(2) MMR** (1ra dosis después de cumplir 1 ano) es necesario un intervalo de al menos 28 días entre las dosis
(3) Hepatitis-B La tercera dosis NO debe administrarse antes de las 24 semanas de edad.	**(3) Hepatitis-B** La tercera dosis NO debe administrarse antes de las 24 semanas de edad.	**(3) Hepatitis-B** La tercera dosis NO debe administrarse antes de las 24 semanas de edad..	**(3) Hepatitis-B** La tercera dosis NO debe administrarse antes de las 24 semanas de edad.
(1) Varicela Después de cumplir 1 año	**(2) Varicela** (1ra dosis después de cumplir 1 año) es necesario un intervalo de al menos 28 días entre las dosis. (A partir del 7-1-2015, la documentación histórica de la enfermedad debe incluir la fecha o edad aproximada de la infección y la firma de un proveedor de atención médica).	**(2) Varicella** (1ra dosis después de cumplir 1 año) es necesario un intervalo de al menos 28 días entre las dosis. (A partir del 7-1-2015,la documentación histórica de la enfermedad debe incluir la fecha o edad aproximada de la infección y la firma de un proveedor de atención médica).	**(1) Varicella** (1ra dosis después de cumplir 1 año) Obligatoria si no hay documentación sobre la enfermedad de la varicela. Los padres o el proveedor de atención médica pueden facilitar los antecedentes de la enfermedad por escrito, pero deben incluir la fecha o la edad aproximada de la infección.
(1-4) Hib La vacuna Hib no se administra después de los 5 años de edad. Si la primera dosis se administra a partir de los 15 meses de edad, la serie está completa. Si la 4 dosis se administra a partir de los 12 meses de edad, la serie está completa. (La dosis requerida puede variar según el tipo de vacuna y la edad a la que se administra la primera dosis).	**Hib** La vacuna Hib no se requiere después de los 5 años de edad.Si aún no tiene 5 años, los mismos requisitos que para el preescolar.		
(1-4) Neumocócica conjugada La vacuna neumocócica no se administra después de los 5 años de edad.Si la primera dosis se administra a partir de los 24 meses de edad, la serie está completa. (Los requisitos de dosis e intervalo pueden variar en función de la edad a la que se recibió la primera dosis).	**Neumocócica conjugada** La vacuna neumocócica conjugada no se requiere después de los 5 años de edad. Si aún no tiene los 5 años, los mismos requisitos que para el preescolar.	**(1) Meningocócica conjugada** Obligatoria para las personas accedan a 7° grado o a los 12 años de edad, lo que ocurra primero (En vigor a partir del 7-1-2015)	**(2) Meningocócica conjugada** Obligatorio para las personas cursen el 12° grado o tengan 17 años, lo que ocurra primero (la segunda dosis no es necesaria si la primera se recibe después de cumplir 16 años).

NOTA: La regla de los cuatro días se aplica a todas las edades mínimas exigidas.

*** Los niños que reciban la 4' dosis de la vacuna DTP/DTaP a partir de los 4 años de edad no están obligados a recibir la 5' dosis.**

** Los niños que reciban la 3' dosis de la vacuna contra la polio a partir de los 4 años de edad y al menos 6 meses después de la 2' dosis no están obligados a recibir la 4' dosis. Los niños de 18 años o mayores no están obligados a recibir la vacuna contra la polio.

**** Si se administran por separado: Se requieren dos dosis de sarampión, dos de paperas y una de rubéola. La primera dosis debe administrarse después del año, y es necesario un intervalo de al menos 28 días entre la primera y la segunda dosis. La segunda dosis contra las paperas solo es necesaria si entro en la escuela el 7-1-2008 o después.